

Blutoxol

თხევადი მადეზინფიცირებელი გამწმენდი კონცენტრატი კვების ინდუსტრიის ობიექტებისთვის

- ▲ სწრაფმოქმედი მადეზინფიცირებელი გამწმენდი საშუალება სამზარეულოსთვის ტუტე ბალანსით
- ▲ აცილებს ცხიმებს, ცილებს და ზეთოვან ლაქებს
- ▲ არ შეიცავს არომატულ დანამატებს
- ▲ მადეზინფიცირებელი მოქმედება დადასტურებულია ევროპული სტანდარტებით EN
- ▲ ეფექტურია საღმონელას, ლისტერიას და ნოროვირუსების წინააღმდეგ
- ▲ შეტანილია სადეზინფექციო საშუალებების ნუსხაში IHO აკმაყოფილებს ევროპული სტანდარტების მოთხოვნებს EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476 და EN 16777
- ▲ გააჩნია შესაბამისობის სერთიფიკატი კვების სექტორში გამოყენებისათვის



გამოყენების სფერო

წყალგაუმტარი და ტუტეგამძლე კედლების, იატაკებისა და სამუშაო ზედაპირების დასუფთავებისა და დეზინფექციისთვის იმ ადგილებში, სადაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰიგიენა. არ გამოიყენება ტუტეების მიმართ მგრძნობიარე ზედაპირების დასუფთავებისთვის.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ რეკომენდებულია შემოწმდეს დასამუშავებელი მასალა პროდუქტის მგრძნობელობაზე, შეუმჩნეველ, მცირე ნაწილზე დატანებით. 1 დოზა = 25 მლ.


სამუშაო ხსნარის დამზადება:

ხსნარისთვის გამოიყენება მხოლოდ ცივი წყალი! დოზირებ იხ. ცხრილში. ჩაასხით 500 მლ ქაფგამფრქვევში ცივი წყალი მარკირებამდე და დაამატეთ 1 ლიტრიანი ბოთლიდან კონცენტრატის ერთი დოზა.

სადეზინფექციო წმენდა:

დაასველეთ ზედაპირი სადეზინფექციო ხსნარით (დაახლ. 15-20 მლ / მ²) და დაამუშავეთ საწმენდი ქსოვილით ან საწმენდი მოწყობილობით. მოხმარება: 0,1 მლ / მ².

ის ზედაპირები და ჭურჭელი, რომელიც უშუალო კონტაქტში იმყოფება საკვებ პროდუქტებთან, ზედმიწევნით კარგად უნდა გაირეცხოს წყლით. ცილოვანი და ცხიმოვანი ნადების არსებობის შემთხვევაში, დაიტანეთ ცივი სამუშაო ხსნარი ზედაპირზე, მიეცით დრო ზემოქმედებისთვის. იატაკების დამუშავებისას დაამატეთ ცხელი წყალი საწმენდი მოწყობილობის ავზიდან.



ნომენკლატურა

ნომენკლატურა	შეფუთვა
j550308	3 ბოთლი x 2 ლ
j550302	6 დოზირებადი ბოთლი x 1 ლ
j550305	2 კანისტრი x 5 ლ
j550310	კანისტრი x 10 ლ
j550372	კასრი x 200 ლ
j550390	კონტეინერი x 1000 ლ

Blutoxol

თხევადი მადეზინფიცირებელი გამწმენდი კონცენტრატი კვების ინდუსტრიის ობიექტებისთვის

შენიშვნა

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისათვის! ბიოციდური პროდუქტები გამოიყენება სიფრთხილით! გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით ინფორმაციას პროდუქტზე.

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

არაიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები <5%, ორგანული მარილები, არაორგანული მარილები, ბიოციდები, საღებავები.

pH კონცენტრატში: დაახლ. 13

pH სამუშაო ხსნარში: დაახლ. 12,5

აქტიური ნივთიერებები 100 გრამში:

2,4 გ დიდცილ დიმეთილამონიუმის ქლორიდი (CAS: 7173-51-5), 1,9 გ ალკილდიმეთილბენზილამონიუმის ქლორიდი (CAS: 68391-01-5).

მარკირება

მარკირება (კონცენტრატში): საშიშია. H314 კანზე და თვალში მოხვედრისას იწვევს ქიმიურ დაშლას. H400 ძალიან ტოქსიურია წყლის ორგანიზმებისთვის. H412 საზიანოა წყლის ორგანიზმებისთვის ხანგრძლივი ეფექტით. P273 მოერიდეთ გარემოში გათავისუფლებას. P280 გამოიყენება ხელთათმანები/სვეც ტანსაცმელი/თვალის/სახის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალში მოხვედრისას: ჩამოიბანეთ წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენიეთ ლინზეები თუ ატარებთ, გააგრძელეთ წყლით გავლება. P308+P313 ПРИ ზემოქმედებაზე ექვს შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. შეიცვაც: კალიუმის სილიკატი / ბენზალკონიუმის ქლორიდი (INCI)

ტესტირება და რეესტრებში შეტანა

რეკომენდებული დოზირება ზედაპირების დეზინფექციისთვის კვების ობიექტებში

ტესტირების მეთოდი	ეფექტიანობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
EN 13697 დეზინფექცია მექანიკური ზემოქმედების გარეშე	ბაქტერიოციდული ლევეროცუდული	მაღალი	5 %	500 მლ/10 ლ	30 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Candida albicans

Blutoxol

თხევადი მადეზინფიცირებელი გამწმენდი კონცენტრატი კვების ინდუსტრიის ობიექტებისთვის

შემდეგი ტესტირებები

ტესტირების მეთოდი	ეფექტიანობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება	დრო	ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
სამრეწველო, კორპორატიული და კვების სექტორი						
EN 1276 ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ბაქტერიოციდული	უმნიშვნელო	2 %	200 მლ/10 ლ	5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ლევეროციდული	უმნიშვნელო	0,5 %	50 მლ/10 ლ	15 წთ	Candida albicans
			1 %	100 მლ/10 ლ	5 წთ	
		მაღალი	2 %	200 მლ/10 ლ	15 წთ	
			3 %	300 მლ/10 ლ	5 წთ	
EN 13697 ზედაპირების დეზინფექცია მექანიკური დამუშავების გარეშე	ბაქტერიოციდული	უმნიშვნელო	7,5 %	750 მლ/ 10 ლ	5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
EN 13697 ზედაპირების დეზინფექცია მექანიკური დამუშავების გარეშე	ლევეროციდული	უმნიშვნელო	3 %	300 მლ/10 ლ	15 წთ	Candida albicans
			2 %	200 მლ/10 ლ	30 წთ	
		მაღალი	4 %	400 მლ/10 ლ	15 წთ	
			3 %	300 მლ/10 ლ	30 წთ	
Вируциды						
EN 14476 ბაქტერიების განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ნოვოვირუსები	უმნიშვნელო	7,5 %	750 მლ/ 10 ლ	30 წთ	Murines Norovirus (MNV)
			5 %	500 მლ/10 ლ	60 წთ	
		მაღალი	7,5 %	750 მლ/ 10 ლ	30 წთ	